

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
Руководителя
Россельхознадзора

25.06.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
БлохНэт® Форте

(Организация-разработчик: ООО «НПК «СКИФФ»; 117246, г. Москва,
Научный проезд, д. 20, стр.3, эт. 2, пом. 204)

Номер регистрационного удостоверения: *47-3-10.20-4681 N17BP3-W.20/03565*

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: БлохНэт® Форте (BlochNet Forte).

международное непатентованное наименование действующих веществ:
фипронил, S-метопрен.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

БлохНэт® Форте в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: фипронил – 75 мг, S-метопрен – 1 мг, в качестве вспомогательных веществ: повидон, изопропиловый спирт, эфирное масло лаванды, моноэтиловый эфир диэтиленгликоля.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную или слабо-опалесцирующую жидкость от светло-жёлтого до жёлтого цвета с запахом лаванды.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства.

БлохНэт® Форте запрещается применять по истечении срока годности.

4. БлохНэт® Форте выпускают расфасованным по: 0,5 мл «для кошек», «для щенков и собак массой до 5 кг»; по 1,0 мл «для щенков и собак массой от 5 до 10 кг»; по 2,0 мл «для щенков и собак массой от 10 до 20 кг»; по 3,0 мл «для собак массой от 20 до 30 кг»; по 4,0 мл «для собак массой от 30 до 40 кг» в пипетки из комбинированных материалов, которые поштучно помещают в блистерные упаковки вместе с вкладышем, на внутренней стороне которого нанесена инструкция по применению.

5. Хранят БлохНэт® Форте в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре не выше 25°C.

6. БлохНэт® Форте следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. БлохНэт® Форте относится к клинико-фармакологической группе инсектоакарицидные средства в комбинациях.

10. Фипронил, входящий в состав препарата – инсектоакарицид группы фенилпирозолов, активен в отношении всех фаз развития вшей, блох, власоедов и клещей (иксодовые, саркоптоидные), паразитирующих на собаках и кошках. Механизм его действия заключается в блокировании ГАМК-зависимых рецепторов и глутамат-хлорных (Glu-хлорных) каналов ЦНС членистоногих, что вызывает блокаду прохождения ионов хлора через клеточные мембраны, приводит к неконтролируемой активности центральной нервной системы, параличу и гибели эктопаразитов.

S-метопрен - аналог природных ювенильных гормонов вызывает аномалии развития насекомых на стадии яйца и личинки, предотвращая появление половозрелых насекомых на животных и в местах их содержания.

После топикального нанесения на кожу активные компоненты препарата постепенно распределяются по поверхности тела, накапливаются в липидном слое, покрывающем эпидермис, волосяных луковицах и сальных железах, оказывают длительное контактное инсектоакарицидное действие, обеспечивая защиту животного от эктопаразитов.

Гибель блох, вшей, власоедов наблюдается в течение суток после обработки животного; защитное действие лекарственного препарата после однократной обработки животного против блох, вшей, власоедов и саркоптоидных клещей сохраняется до 8 недель, против иксодовых клещей до 5 недель.

Повторные обработки животных проводят по показаниям, но не чаще одного раза в месяц.

БлохНэт® Форте по степени воздействия на организм относится к мало опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 при накожном нанесении), в рекомендуемых дозах не оказывает кожно-раздражающего и резорбтивно-токсического действия, при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Препарат токсичен для кроликов, а также рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. БлохНэт® Форте применяют собакам и кошкам с 8-недельного возраста при энтомозах, вызванных блохами, вшами и власоедами, поражении иксодовыми клещами, отодектозе, саркоптозе и нотоэдрозе, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

12. Противопоказанием для применения является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Запрещается применение БлохНэт® Форте больным инфекционными болезнями и ослабленным животным, собакам массой менее 2 кг и кошкам массой менее 1 кг.

Не допускается аурикулярное применение препарата для лечения ушной формы чесотки (отодектоза) при прободении барабанной перепонки.

13. При применении препарата следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с БлохНэт® Форте. В течение 48 часов после обработки животное не следует гладить и подпускать к маленьким детям.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

В случае попадания препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом; при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут проточной водой. В случае проявления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Не рекомендуется применение препарата беременным и лактирующим кошкам и сукам, а также котят и щенкам моложе 8-недельного возраста.

15. БлохНэт® Форте применяют однократно путем точечного нанесения на сухую и неповрежденную кожу в места, недоступные для слизывания животным: собакам – в несколько точек в области спины между лопатками и в области шеи, у основания черепа; кошкам – в области шеи, у основания черепа в дозах, указанных в таблице.

Таблица

Вид животного, масса	Доза препарата
Собаки	
2 кг – 5 кг	0,5 мл
5 кг – 10 кг	1,0 мл
10 кг – 20 кг	2,0 мл
20 кг – 30 кг	3,0 мл
30 кг – 40 кг	4,0 мл
Кошки	
1 кг – 5 кг	0,5 мл
5 кг - 10 кг	1,0 мл/2 пипетки

При обработке собак массой более 40 кг на каждые последующие 10 кг дополнительно наносят по 1 мл препарата.

Не следует мыть и купать животное в природных водоемах в течение 48 часов после обработки, а также наносить препарат на влажную или поврежденную кожу.

Для уничтожения присосавшихся к телу животного иксодовых клещей препарат в количестве 1 капли наносят на клеща и место его прикрепления к коже. Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают из кожи пинцетом и уничтожают.

Для лечения отодектоза БлохНэт® Форте закапывают в каждое ухо по 4-6 капель. Для равномерного распределения препарата ушную раковину складывают пополам и слегка массируют ее основание. Обработку проводят два раза с интервалом 5-7 дней. БлохНэт® Форте обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного уха.

При осложнении отодектоза отитом назначают противомикробные и противовоспалительные средства.

При саркоптозе собак и нотоэдрозе кошек препарат в дозе 0,3 мл/кг массы тела наносят на поражённые участки с захватом по периферии до 1 - 2 см здоровой кожи трехкратно с интервалом 7 суток до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

Для предотвращения слизывания препарата животным надевают шейный воротник, намордник или смыкают челюсти петлёй из тесьмы, которые снимают через 45-60 минут после нанесения препарата.

16. В редких случаях на месте нанесения препарата возможно склеивание шерсти, зуд, покраснение кожи, при попадании препарата внутрь – гиперсаливация, угнетение, рвота.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, угнетение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат смывают водой с моющим средством и назначают средства симптоматической терапии.

18. БлохНэт® Форте не следует применять совместно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных.

19. Особенности действия при первом применении БлохНэт® Форте не установлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, т.к. это снижает его эффективность. В случае пропуска очередной обработки её следует провести как можно скорее и в той же дозе.

21. БлохНэт® Форте не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование производственной производителя препарата для применения.	и площадки лекарственного ветеринарного	адрес ООО «НВП «Астрафарм»: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50
---	--	--

Наименование, уполномоченной	адрес организации, держателем или	ООО «НВП «Астрафарм»: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 3, эт. 3, пом. I, ком. 35.
---------------------------------	--------------------------------------	---

владельцем регистрационного Тел/факс: (495) 785-83-50
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.