

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора



К.А.САВЕНКОВ

20.04.2021

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Тривит<sup>®</sup> раствор для инъекций

(организация-разработчик: АО «Мосагроген»,  
117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, д. 1, стр. 1, пом. IV эт. 1 ком б)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-2.12-0568№ПВР-3-1.9/00004

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тривит<sup>®</sup> раствор для инъекций (Trivit solutio pro injectionibus).

Международные непатентованные и группировочные наименования действующих веществ: ретинол, колекальциферол, альфа-токоферол.

2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.

Тривит<sup>®</sup> раствор для инъекций в 1 мл в качестве действующих веществ содержит: ретинола ацетат или пальмитат (витамин А) – 30000 МЕ, колекальциферол (витамин D<sub>3</sub>) – 40000 МЕ, альфа-токоферола ацетат (витамин Е) – 20 мг, в качестве вспомогательного вещества – масло растительное (подсолнечное или соевое).

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость от светло-желтого до желтого цвета. Допускается легкая опалесценция.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения - 2 года с даты производства. Запрещается использование лекарственного препарата по истечении срока годности.

4. Тривит<sup>®</sup> раствор для инъекций выпускают расфасованным по 10, 20 и 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы объемом 10 мл упаковывают в картонные коробки по 4, 20 штук, флаконы объемом 20 мл по 20 штук. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Тривит® раствор для инъекций следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Тривит® раствор для инъекций отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Тривит® раствор для инъекций относится к группе витаминных препаратов.

10. Оказывает комплексное действие на организм животных и птицы, выражающееся в нормализации обмена веществ, профилактике гипо- и авитаминозов А, D<sub>3</sub>, Е и заболеваний, развивающихся на их фоне.

Тривит® раствор для инъекций по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Тривит® раствор для инъекций применяют для профилактики гиповитаминозов у сельскохозяйственных животных и птицы. Препарат показан при ксерофтальмии, рахите, остеомалации и нарушении функции воспроизводства животных и птиц.

12. Препарат противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов препарата, с осторожностью препарат применяют животным с нарушениями функции печени и почек.

13. При работе с препаратом Тривит® раствор для инъекций следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Беременным и новорожденным животным препарат применяют с осторожностью по строгим показаниям и под наблюдением ветеринарного врача, лактирующим животным препарат применяют без ограничений.

15. Препарат вводят животным и птице внутримышечно или подкожно 1 раз в неделю в течение месяца в дозах, указанных в таблице. При необходимости инъекции препарата повторяют через месяц.

Вид животных	Внутримышечно или подкожно, мл/животное
Крупный рогатый скот	2,0 – 5,0
Лошади	2,0 – 2,5
Жеребята, телята	1,5 – 2,0
Овцы, козы	1,0 – 1,5
Ягнята, поросята	0,5 – 1,0
Свиньи	1,5 – 2,0
Куры	0,1 – 0,2
Собаки	0,5 – 1,0
Кролики	0,2 – 0,3

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у сельскохозяйственных животных и птицы, как правило, не наблюдается.

17. Симптомы передозировки у животных не выявлены.

18. Применение препарата Тривит® раствор для инъекций не исключает использование других лекарственных средств.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и при отмене не установлено.

20. При случайном увеличении интервала между двумя введениями препарата, его следует ввести как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

21. Продукцию животноводства и птицеводства после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

АО «Мосагроген»  
Российская Федерация, 117545,  
г. Москва,  
1-ый Дорожный проезд, д. 1.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Мосагроген»  
Российская Федерация, 117545, г.  
Москва, проезд Дорожный 1-ый,  
д. 1, стр. 1, пом. IV эт. 1 ком 6.  
т/ф (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора  
АО «Мосагроген», к.т.н.



И.А. Казакова