

ФЕБТАЛ®

таблетки

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Фебтал таблеток для дегельминтизации животных

Утверждена Заместителем Руководителя Россельхознадзора Власовым Н.А.

Регистрационный номер в РОССИИ 77-3-7.0-0142 № ПВР-2-1.9/00109 от 30.12.10

Регистрационный номер в МОЛДОВЕ №2127 от 11.04.2014

Антигельминтик для лечения и профилактики болезней собак и кошек, вызываемых ленточными и круглыми гельминтами

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Торговое наименование лекарственного препарата:
Фебтал таблетки (Tabulettae Febtalum).

Международное непатентованное наименование:
фенбендазол.

Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Препарат в качестве действующего вещества в 1 таблетке содержит фенбендазол – 0,15 г, а также вспомогательные вещества.

Плоские таблетки, имеющие с одной стороны риску, с другой – логотип (крест в центре щита), упакованы по 6 штук в блистеры из поливинилхлоридной пленки, помещенные поштучно в картонные коробки.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Запрещается применение Фебтала таблеток по истечении срока годности.

Хранят Фебтал таблетки в закрытой упаковке производителя, в защищенном от света и влаги месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C. Фебтал таблетки следует хранить в местах, недоступных для детей.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фенбендазол, входящий в состав препарата, обладает широким спектром нематоцидного и цестоцидного действия, активен в отношении взрослых форм, личинок и яиц нематод желудочно-кишечного тракта, а также цестод, паразитирующих у животных.

При пероральном введении лекарственного препарата фенбендазол легко всасывается в кишечнике и распределяется в органах и тканях животного; выделяется из организма в неизменной форме и в виде метаболитов, в основном с желчью и частично с мочой, у лактирующих животных также с молоком.

Фебтал таблетки в рекомендуемых дозах хорошо переворачиваются животными.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Фебтал таблетки назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при токсокарозе, токсаксаридозе, аниклостомозе, унцинариозе, диплидиозе, тенидиозах.

Противопоказанием к применению Фебтала таблеток является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Не следует применять препарат истощенным и больным инфекционными болезнями животным, а также щенкам и котятам моложе трехнедельного возраста.

Фебтал таблетки задают животным однократно в следующих дозах:

- взрослым собакам и кошкам – 1 таблетка на 1,5 кг массы животного;
- щенкам и котятам (в возрасте старше трех недель) – 1 таблетка на 3 кг массы животного.

Специальной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

Побочных явлений и осложнений при применении Фебтала таблеток в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к фенбендазолу и появлении аллергических реакций использование препарата прекращают.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

При проведении лечебно-профилактических мероприятий с использованием Фебтал таблеток следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Организация-производитель: ООО «НВЦ АгроВетзащита С-П.»

Отзывы о препарате и заявки на его оптовые поставки просим направлять по адресу:
Россия, 129329, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, тел.: (495) 648-26-26.

Интернет: www.vetmag.ru, e-mail: help@vetmag.ru

Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).

