

АЗИНОКС

для собак и кошек

ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата Азинокс для собак и кошек

Согласовано заместителем Руководителя Россельхознадзора Власовым Н.А.
(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агротезащита», Россия, 129329, Москва,
Игарский проезд, д. 4, стр.2)

Номер регистрационного удостоверения:
в России 77-3-7.0-4314НеПВР-2-1.2/00898 от 16.11.2018

I. Общие сведения

Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование: Азинокс для собак и кошек (Azinox for dogs and cats).

международное непатентованное наименование: празиквантел

Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Лекарственный препарат в 1 таблетке в качестве действующего вещества содержит празиквантел – 50 мг, а также вспомогательные вещества: лактозу и крахмал картофельный.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой плоские таблетки белого цвета с риской и логотипом.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Неиспользованную половину таблетки рекомендуется поместить в блистер и хранить до следующей дегельминтизации, но не более 3 месяцев после вскрытия упаковки. Запрещается применение лекарственного препарата по истечении срока годности.

Выпускают препарат расфасованным по 3 или 6 таблеток в блистеры из полимерной пленки и фольги, упакованные индивидуально в картонные пачки. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

Азинокс для собак и кошек относится к группе антигельминтных средств.

Входящий в состав препарата празиквантел – ацилированное производное пиазинизохинолина, обладает широким спектром цестодоцидного действия на все фазы развития ленточных гельминтов (цестод), паразитирующих у собак и кошек, в том числе *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Mesocostoides spp.*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum* и *Diphyllotoides latum*.

Механизм его действия основан на индуцировании распада тегумента и ингибировании фумаратредуктазы, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что вызывает паралич и гибель цестод и способствует их выведению из желудочно-кишечного тракта.

Празиквантел быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 30-60 минут, распределяется в органах и тканях животного; связывается с сывороточными белкам крови (70-80%), частично метаболизируется в печени, резкретируется в кишечник, выводится из организма в основном с мочой (до 80%) в течение 24 часов.

Азинокс для собак и кошек по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсibilизирующего

действия. Хорошо переносится собаками и кошками разных пород и возраста.

III. Порядок применения

Азинокс для собак и кошек назначают для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых ленточными гельминтами (дипилидиоз, дифиллоботриоз, мезостеозидозы, тениидозы, включая эхинококкоз).

Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе), выраженные нарушения функции почек и печени. Не подлежат дегельминтизации истощенные и больные инфекционными болезнями животные.

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Азинокс для собак и кошек.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Дегельминтизацию самок в период беременности и вскармливания потомства при необходимости проводят под наблюдением ветеринарного врача за 3 недели до предполагаемых родов и через 2-3 недели после родов. Препарат не следует применять щенкам и котятм до 3-недельного возраста.

Азинокс для собак и кошек применяют индивидуально, однократно, перорально (внутрь) в дозе 1 таблетка на 10 кг массы животного в утреннее кормление с небольшим количеством корма.

Кошкам и собакам массой менее 5 кг препарат применяют в виде водной суспензии, для приготовления которой ½ таблетки измельчают, суспендируют в 5 мл воды, интенсивно взбалтывают и точно вводят животному внутрь с помощью шприца без иглы из расчета 1 мл суспензии на 1 кг массы животного.

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств животным перед дегельминтизацией не требуется.

С лечебной целью собак и кошек дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью – ежеквартально в терапевтической дозе.

Побочных явлений и осложнений у собак и кошек при применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам лекарственного препарата и появлении аллергических реакций животному назначают антигистаминные и симптоматические средства.

При значительной передозировке лекарственного препарата у животного может наблюдаться нарушение моторики желудочно-кишечного тракта и угнетенное состояние.

Не следует применять Азинокс для собак и кошек одновременно с лекарственными средствами, содержащими пиперазин и препаратами, ингибирующими холинэстеразу.

Особенностей действия препарата при его первом применении и отмене не установлено.

Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков дегельминтизации животных, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной дегельминтизации препарат применяют в дозе и по схеме, установленной настоящей инструкцией.

Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.



Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.
Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.
Телефон круглосуточной «Горячей линии»: 8-800-700-19-93 (звонок из России бесплатный).
Информация о подтверждении соответствия продукта размещена на сайте www.vetmag.ru